



อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Ticlopidine

มีข่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคม 2541 เกี่ยวกับยา Ticlopidine ว่าอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของโลหิต ได้แก่ thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

Ticlopidine เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anti-thrombotic, platelet aggregation inhibitor) มีข้อบ่งใช้ในการลดความเสี่ยงของการเกิด thrombotic stroke รวมทั้งใช้ป้องกันการเกิด stroke ในคนไข้ที่ไม่ตอบสนองหรือใช้ยา aspirin ไม่ได้

จากรายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (ปี 1989-1996) มีรายงานเกี่ยวกับอาการอันไม่พึงประสงค์ของยามีทั้งสิ้น 3,759 ราย ที่สำคัญ ได้แก่ leucopenia (550 ราย), granulocytopenia (476 ราย), thrombocytopenia (260 ราย), rash (452 ราย), hepatic function abnormal (538 ราย), hepatocellular damage (318 ราย), jaundice (241 ราย), diarrhea (366 ราย), purpura (225 ราย), anemia (120 ราย) และเสียชีวิต (124 ราย)

ในประเทศไทย Ticlopidine จัดเป็นยาอันตราย มีรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ (มกราคม 2535 - ธันวาคม 2540) 9 ราย ได้แก่ agranulocytosis (1), cheilitis (1), fatigue (1), oedema (1), pruritus (2), purpura (1), rash (1), และ Stevens Johnson Syndrome (1)

มีข้อห้ามใช้ยามีกับผู้ป่วยซึ่งตกเลือด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ สมรรถภาพของตับเสื่อม หรือ hematopoietic disorders รวมทั้งการระมัดระวังเมื่อใช้ยาร่วมกับยา anticoagulants เช่น heparin หรือ thrombolytic agents เช่น streptokinase, urokinase รวมทั้งยาลดกรดซึ่งประกอบด้วย aluminium และ magnesium, ยา aspirin และยาในกลุ่ม xanthines เช่น aminophylline, theophylline และหากพบอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานี้ โปรดแจ้งศูนย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือศูนย์ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ