



### อาการอันไม่พึงประสงค์ต่อดับอย่างรุนแรงของยา Flutamide

องค์การอนามัยโลกได้แจ้งข่าวเตือนเกี่ยวกับยา Flutamide ว่าอาจทำให้เกิด hepatic dysfunction (รวมทั้ง fulminant hepatitis) โดยมีผู้ป่วยในประเทศญี่ปุ่นเสียชีวิตไปแล้วจำนวน 8 ราย

Flutamide มีฤทธิ์ antiandrogenic effects มีข้อบ่งใช้ในการรักษา metastatic prostatic carcinoma (stage D2) โดยใช้ร่วมกับ luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) นอกจากนี้ยังอาจใช้ในการรักษา benign prostatic hyperplasia (BPH) แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงของการเกิดพิษต่อดับอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน

อาการอันไม่พึงประสงค์เมื่อใช้ยา Flutamide ร่วมกับ LHRH agonists ได้แก่ hot flashes (61%), loss of libido (36%), impotence (33%), diarrhea (12%), nausea/vomiting (11%), gynecomastia (9%), GI disturbances (6%) เป็นต้น

จากฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (ปี 1989-1998) มีรายงานทั้งสิ้น 1,421 ฉบับ พบอาการอันไม่พึงประสงค์ 3,125 รายการ อาการอันไม่พึงประสงค์ต่อดับที่สำคัญ คือ hepatitis function abnormal (331 ราย), hepatitis neoplasm malignant (1 ราย), hepatitis enzymes increased (15 ราย), hepatocellular damage (173 ราย), jaundice (168 ราย), hepatitis infectious (2 ราย), phosphatase alkaline increased (39 ราย)

ในประเทศไทย Flutamide จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ มีรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์ (มกราคม 2538- ธันวาคม 2540) จำนวน 1 ราย ได้แก่ hepatitis cholestatic jaundice

มีข้อแนะนำในการใช้ คือ ควรตรวจการทำงานของตับเป็นระยะ ๆ เมื่อผู้ป่วยได้รับยาเป็นเวลานาน และหากพบการทำงานของตับผิดปกติให้หยุดยาในทันที และโปรดแจ้งมายังศูนย์ติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป