

**อันตรายจากการใช้ยา Misoprostol ในทางที่ผิด**

สืบเนื่องจากข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ประกอบกับข้อมูลจากส่วนพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุขส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่ามีการนำยา Misoprostol ไปใช้ไม่ถูกต้องในผู้ที่ต้องการทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งพบมากในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ โดยวิธีส่วนใหญ่จะนำขี้ยาขับประจำเดือนจากร้านขายยา ขี้ยานี้จะส่งผลให้มดลูกเกร็งตัวและมีเลือดออกทางช่องคลอด ซึ่งมักเป็นสาเหตุให้สตรีเหล่านี้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ยา Misoprostol เป็น Prostaglandin E2 analogue ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบตัว ในปัจจุบันเป็นยาขึ้นทะเบียนในขนาด 200 ไมโครกรัม มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาแผลของลำไส้เล็กส่วนต้นและกระเพาะอาหาร รวมทั้งให้ป้องกันการเกิดแผลของกระเพาะอาหารที่เกิดจากการใช้ยา NSAIDs การใช้ยานี้ในขนาดสูงเพื่อทำแท้ง พบว่า 72% เกิดการแท้งที่ไม่สมบูรณ์ โดยมีเพียง 18% เท่านั้นที่การแท้งเกิดขึ้นสมบูรณ์ ซึ่งขนาดใช้ยาเฉลี่ยคือ 800 ไมโครกรัม ข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยานี้ในประเทศไทยและขององค์การอนามัยโลก พบว่า ส่วนใหญ่เกิด menstrual disorders และ vaginal/uterine hemorrhage

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายในการใช้ยา และคณะกรรมการยา ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าหากมีการนำยานี้ไปใช้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย จะมีอันตรายต่อผู้ใช้ได้อย่างรุนแรง และเมื่อสอบถามความคิดเห็นไปยังคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์หลายแห่งต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนั้น จึงมีมติให้ปรับสถานภาพยา Misoprostol เป็นยาควบคุมพิเศษโดยกำหนดให้จำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น

ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงแจ้งมายังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังติดตามความปลอดภัยเพื่อลดปัญหาไม่ให้เกิดการใช้ยานี้ในทางที่ผิดอีกต่อไป